

این دارو برای بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران جداً خودداری نمایید.

◀ شکل دارویی:

- کپسول خوراکی حاوی:
- استامینوفن ۳۲۵ میلی گرم
- کافئین ۴۰ میلی گرم
- ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم

◀ دسته دارویی:

ضد درد، ضد التهاب غیراستروئیدی

◀ مکانیسم اثر:

- کافئین عروق خونی مغز را منقبض می‌کند و این اثر ممکن است به رفع سردرد کمک نماید.
- اثرات ضد درد و ضد تب این دارو نیز مربوط به استامینوفن و ایبوپروفن می‌باشد.

◀ موارد مصرف:

این دارو در درمان سردردهای خفیف تا متوسط ناشی از سردرد (عصبی و میگرنی)، دندان درد، دردهای عصبی و ماهیچه‌ای، دردهای مفصلی و دیسمنوره کاربرد دارد.

◀ مقدار مصرف:

برای بزرگسالان و کودکان بالاتر از ۱۲ سال هر ۴-۶ ساعت یک عدد می‌باشد و مصرف این دارو در کودکان کمتر از ۱۲ سال مجاز نمی‌باشد.

◀ موارد منع مصرف:

در صورت داشتن سابقه حساسیت نسبت به این دارو یا سایر داروهای مشابه و یا ابتلا به نارسایی کبدی، نارسایی کلیوی، هیپرتروئیدسم، افزایش فشارخون، بیماری‌های قلبی-عروقی، زخم معده، آریتمی قلبی و تشنج مصرف این دارو توصیه نمی‌گردد.

◀ مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمی‌شود و مصرف آن تنها با تجویز پزشک متخصص امکان پذیر است.

◀ هشدارها:

- این دارو ممکن است سبب سرگیجه، خواب‌آلودگی و اختلال در بینایی گردد، لذا در حین مصرف این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند خودداری شود.
- به محض مشاهده هرگونه علائمی مانند پرخاشگری، بی‌خوابی و نشانه‌ای از خونریزی معده (درد معده، مدفوع سیاه رنگ و خونی، استفراغ خونی و ...) مصرف دارو را متوقف و به پزشک مراجعه نمایید.

◀ تداخل های دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می‌کنید، پزشک و یا داروساز خود را مطلع نمایید:
از مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و داروهایی با ترکیب مشابه (حاوی استامینوفن و ایبوپروفن و کافئین) خودداری شود.
از مصرف ترکیبات گزانتینی نظیر تتوفیلین همراه با این دارو که باعث افزایش ترشح اسید معده و زخم معده می‌شود، اجتناب گردد.

◀ عوارض جانبی دارو:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه ی این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، ولی در صورت بروز هر یک از عوارض زیر، سریعاً با پزشک یا دکتر داروساز خود مشورت نمایید:
آسیب کبدی و کلیوی، مشکلات تنفسی، آلرژی پوستی و کهیر، تپش قلب، گیجی، توهّم، تشنج، عصبانیت، وزوز گوش، تاری دید، افسردگی، تهوع، استفراغ، اسهال و درد شکم و معده.

◀ شرایط نگهداری دارو:

- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.
- دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.

◀ بسته بندی:

شرکت داروسازی ریحانه کپسول ریفن را در بلیسترهای ۱۰ عددی درون جعبه های ۳۰ عددی تولید و بسته بندی می کند.

References:

- British National Formulary (BNF), 2021.
- Martindale 40th edition, 2020.